

JUN

JUL

AGO

DESARROLLO VEGETATIVO

Podar, corregir deficiencias y sazonar brotes



Super Arrancador



Balanceador de Nitratos



Zinc



Golden Harvest plus



Stimulate

Desde el inicio de las lluvias o junio si cuenta con riego, puede los árboles despuntando y cortando ramas para generar nuevos brotes vegetativos. Cuando las hojas tomen color alimonado o marrón, según la variedad, aplique al follaje 2 litros de **Super Arrancador** más 1 litro de **Keylate Zinc** más 330 mililitros por hectárea de **Stimulate**. Repita la aplicación 14 días después. También puede optar por aplicar **Agrimix-F** al suelo en dosis de 250 gramos por árbol, y repetir la aplicación 60 días después.

Durante agosto y la primera quincena de septiembre se deben sazonar los brotes para uniformizar su edad y prepararlos para una mejor respuesta a la inducción floral. Para ello, aplique al follaje 3 litros de **Balanceador de Nitratos** más 3 litros por hectárea de **Golden Harvest Plus**. Repita la aplicación 14 días después; procurando que esta segunda aplicación quede alejada por lo menos a 15 días de la primera aplicación de inducción floral.

SEP

OCT

NOV

FLORACIÓN Y AMARRE

Inducir flor y asegurar amarre



NBX



FERTI-ULTRA NK

(13-00-46+1% S)



CaB



Flower Power



X-Cyte

A partir de la última semana de septiembre y durante todo octubre aplique **FERTI-ULTRA NK** a razón de 3% (3 kilos por cada 100 litros de agua) en mango Ataulfo, y al 5% en mango Tommy Atkins, más 3 litros por hectárea de **NBX**. Repita la aplicación cada 5 a 8 días hasta observar que los brotes florales han iniciado.

Durante el desarrollo del ramillete floral aplique 2 litros de **CaB** más 1 litro de **Flower Power** más 500 mililitros por hectárea de **X-Cyte**. Repita la aplicación a los 14 días.

DIC

ENE

FEB

DESARROLLO DEL FRUTO

Evitar "mango niño" y mejorar tamaño y calidad del fruto



N-Large



Sugar Mover



Harvest More

05-05-45



Root Feed



Harvest More

12-00-46

Realice una primera aplicación dirigida al follaje y los frutos cuando estos tengan 1 centímetro de diámetro con 330 mililitros de **N-Large** más 5 kilos por hectárea de **HM 05-05-45**. Repita dos aplicaciones más cada 14 a 21 días.

Para mejorar el color y los grados brix (dulzura) sustituya el **N-Large** por 2 litros de **Sugar Mover** en la segunda y tercera aplicación.

Tommy Atkins es muy exigente de calcio, y en algunos casos Ataulfo también requiere calcio a tiempo para evitar caída de frutillos o pudriciones internas de frutos antes de cosechar. Para evitar estas anomalías aplique 500 gramos de **Root Feed** más 500 gramos de **HM 12-00-46** por árbol, sobre suelo húmedo, a partir de que los frutos tengan tamaño "huevo de paloma". Repita por lo menos una aplicación a los 21 días.



Stoller

TECNOLOGÍA PARA ADELANTAR COSECHA EN MANGO