

Aguacate

Programa de Aplicaciones



SOLUCIONES INTEGRALES STOLLER



Stoller
Together we grow.

Etapa		PREFLORACIÓN	ESTADO COLIFLOR	FLORACIÓN	CUAJADO DE FRUTO	ENGORDE DE FRUTO	MADUREZ
Objetivo		Disminuir el vigor vegetativo y asegurar la brotación	Estimular la floración	Flores fértiles y mayor número de frutos amarrados	Iniciar el desarrollo de los frutos	Incrementar el tamaño y peso de frutos	Incrementar materia seca (calidad)
Frecuencia		Previo al crecimiento de brotes, 2 aplicaciones con intervalo de 21-30 días	En yemas hinchadas, 2 aplicaciones con intervalo de 21-30 días	Al alcanzar el 50% de flores por árbol, 2 aplicaciones con intervalo de 21-30 días	Iniciar al tener mayoría de frutos en tamaño cerrillo, 2 aplicaciones con intervalo de 21-30 días	Iniciar al tener mayoría frutos con 50% de tamaño final, 2 aplicaciones con intervalo de 21-30 días	Realizar 2 aplicaciones, a los 60 y 30 días antes de cosecha
Vía Foliar	Fisiología	Balanceador de Nitratos. 3 L/Ha	NBX 3 L/Ha Stimulate 1.5 L/Ha X-Cyte 500 ml/Ha	X-Cyte 1.5 L/Ha NBX 3 L/Ha	X-Cyte 1.5/Ha	Stimulate 1.5 L/Ha	Sugar Mover. 3 L/Ha Stimulate 500 ml/Ha
	Nutrición	Harvest More 05-05-45 4 Kg/Ha	Harvest More 10-55-10 4 Kg/Ha	CaB 2 L/Ha		Harvest More 05-05-45 5 Kg/Ha	
	Protección			Golden Pest Spray Oil 4 L/Ha en mezcla con otros insecticidas			
	Coadyuvante	Carrier 1 L/Ha en mezcla con el resto de los productos en cada aplicación					
Vía Suelo	Fisiología	Root Feed 10 Kg/Ha			Root Feed 15 Kg/Ha		
	Nutrición	Continuar con un programa de Nutrición de Alta Eficiencia.					