

Piña

Programa de Aplicaciones



SOLUCIONES INTEGRALES STOLLER



Stoller
Together we grow.

Etapa	TRASPLANTE (PRIMERO Y SEGUNDO MES DDT)	DESARROLLO VEGETATIVO (TERCERO HASTA EL SÉPTIMO MES DDT)	PRE-INDUCCIÓN (OCTAVO AL DÉCIMO MES DDT)	POST-INDUCCIÓN	FLORACIÓN (PRIMERO Y SEGUNDO MES DDI)	DESARROLLO DE FRUTO (TERCERO Y CUARTO MES DDI)	LLENADO FINAL (5TO MES DDI)	POST COSECHA (PRIMERO Y SEGUNDO MES DDC)
Objetivo	Establecimiento efectivo	Lograr un adecuado desarrollo de planta	Incrementar el grosor y peso de la planta	Asegurar una adecuada división celular (tamaño y peso)	Iniciar el desarrollo del fruto	Asegurar el llenado del fruto	Asegurar el peso, tamaño y calidad	Multiplicación de hijuelos
Frecuencia	Aplicar a los 30 ddt y repetir a los 60 ddt	Aplicar a los 80 días ddt y repetir cada 30 días hasta acumular 4 aplicaciones en total	Aplicar a los 40 días antes de la inducción. Repetir a los 20 días antes de la inducción.	1 aplicación a los 10 días ddi.	Aplicar a los 30 ddi y repetir a los 60 ddi.	Aplicar a los 90 días ddi y repetir a los 105 días ddi.	Aplicar a los 130 días ddi (faltando 20 días para la cosecha).	Aplicar a los 20 ddc, repetir a los 40 ddc
Vía Foliar	Fisiología Stimulate® 1 L/Ha Root Feed® 12.5 Kg/Ha	Root Feed® 12.5 Kg/Ha	X-Cyte® 2 L/Ha	X-Cyte® 3 L/Ha NBX® 2 L/Ha	X-Cyte® 2 L/Ha NBX® 2 L/Ha	N-Large® 2 L/Ha	Sugar Mover® 3 L/Ha Stimulate® 1 L/Ha	Bud Feed® 10 L/Ha X-Cyte® 2 L/Ha
	Nutrición	Despegue Plus® 5 L/Ha	Folizyme® FORTE 3 L/Ha Super Arrancador® 3 L/Ha	CaB® 4 L/Ha	CaB® 3 L/Ha	Harvest More Calcio-18® 25 Kg/Ha Harvest More 05-05-45® 25 Kg/Ha	Harvest More Calcio-18® 25 Kg/Ha Harvest More Super-K60® 25 Kg/Ha	Harvest More 30-10-10® 12.5 Kg/Ha
	Protección					Golden Pest Spray Oil® 1 L/Ha en mezcla con otros insecticidas		