

Nochebuena Programa Nutricional



Aplicación Foliar

Reducir el estrés post-trasplante

Vía foliar con **briseado fino** con intervalos de 7 a 14 días





Reducir estrés por Altas temperaturas, estrés hídrico, por ataques de araña roja y trips

Vía foliar con **briseado fino** con intervalos de 7 a 14 días










Reducir estrés por Altas Temperaturas o por toxicidad

Vía foliar con **briseado fino** con intervalos de 7 a 14 días



Aplicación por Riego

PRODUCTOS APLICACIÓN AL SUSTRATO	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
 Root Feed STOLLER		VIERNES ●●●		VIERNES ●●●	VIERNES ●●●	VIERNES ●●●	VIERNES ●●●	VIERNES ●●●	VIERNES ●●●	VIERNES ●●●
 Harvest More 10-55-10	LUNES ●●●●									
 Harvest More 30-10-10			LUNES ●●●●							
 Harvest More 20-30-10				LUNES ●●●●	LUNES ●●●●					
 Harvest More 20-20-20 + AGRIMIX-F						LUNES ●●●●	LUNES ●●●●			
 Harvest More 05-10-27 + AGRIMIX-F								LUNES ●●●●		
 Harvest More 05-05-45 + AGRIMIX-F									LUNES ●●●●	LUNES ●●●●

Harvest More 1 gr/L de agua - Root Feed® 0.5 gr/L de agua - Agrimix 200 gr/2,500 m²

*Las declaraciones de este documento se ofrecen con fines de información únicamente. Basada en datos técnicos al nivel actual de nuestro conocimiento y es para uso por personas con las habilidades técnicas necesarias y bajo su propia discreción y riesgo. El usuario del producto es responsable de la observación de las leyes y reglamentos que implique su uso. Para mayor información consulte con el Departamento Técnico Stoller en México.

stollermexico.com
A Corteva Agriscience Business